

# PROMALIN - RECOMENDACAO

- Tamanho e Formato de Frutos
- Melhora do Material Produtivo
- Retorno de Florada
- Controle Russeting (moderado)
- **Raleio químico (Fraco)**

500 ml/ha em Plena Flor  
+  
500 ml/ha 7 Dias após a Primeira aplicação

- Tamanho e Formato de Frutos
- Melhora do Material Produtivo
- Retorno de Florada
- Controle de Russeting

500 ml/ha em Queda de Pétalas  
+  
500 ml/ha 7 Dias após a Primeira aplicação

# RECOMENDAÇÃO DE USO

- GALA {
  - PROMALIN 500 ml em Plena Flor
  - PROMALIN 500 ml 7 dias após a primeira
  - MaxCel 2,0 l/ha + ANA 10 ppm
  
- GALA {
  - ANA 5 dias após Plena flor
  - MaxCel 2,0 l/ha + ANA 10 ppm
  
- GALA {
  - MaxCel 2,0 l/ha + ANA 10 ppm

# RECOMENDAÇÃO DE USO

- FUJI {
  - PROMALIN 500 ml em Plena Flor
  - PROMALIN 500 ml 7 dias após a primeira flor
  - MaxCel 4,0 l/ha + Carbaryl 1,0 l/ha
  
- FUJI {
  - ANA 5 dias após Plena flor
  - MaxCel 4,0 l/ha + Carbaryl 1.0 l/ha
  
- FUJI {
  - MaxCel 6,0 l/ha + Carbaryl 1.0 l/ha